

## Вариант 1

1

Неотложная помощь при почечной колике|.

- A* Введение баралгина
- B* Холод на поясницу
- C* Назначение диуретиков
- D* Введение натрия хлорида
- E* Введение глюкозидов

2

В больного во время мочеиспускания выделяется кровь. Как называется эта патология?

- A* Тромбоцитурия
- B* Пиурия
- C* Гематурия
- D* Химурия
- E* Эритроцитурия

3

Каким катетером медицинская сестра проводит катетеризацию мочевого пузыря у мужчин в случае острой задержки мочи?

- A* Катетером Петцера
- B* Металлическим
- C* Не суть важно
- D* Резиновым
- E* Катетером для мочеточника

4

С помощью манипуляционного цистоскопа через отверстия мочеточников проводят катетеризацию одного или двух мочеточников тонкими катетерами, через них вводят водорастворимые контрастные препараты (уротраст), которые наполняют мочеточники и почечные лоханки. После этого проводят обзорный рентгеновский снимок, на котором изображены почечные лоханки и мочеточники. Этот метод носит название:

- A* Экскреторная урография
- B* Ретроградная пиелография
- C* Хромоцистоскопия
- D* Цистоскопия
- E* Внутривенная урография

5

Какое название имеет аппарат для измельчения камней в почках и мочевом пузыре?

- A* Литотриптор
- B* Катетеризационный цистоскоп
- C* Катетер
- D* Зажим Федорова
- E* Катетер для мочеточника

6

На прием обратилась женщина с жалобами на схваткообразные боли в пояснице слева, которые отдают в половые органы, частое мочеиспускание. При осмотре: пациентка беспокойна, часто меняет положение в результате нестерпимой боли. Какой симптом наиболее информативен для уточнения диагноза?

- A* Симптом Ровзинга
- B* Симптом Щоткина-Блюмберга
- C* Симптом Пастернацкого
- D* Симптом Ситковского
- E* Симптом Воскресенского

7

Пациент 50-ти течение находится на обследовании в урологическом отделении. Пациенту назначена хромоцистоскопия. Какой раствор должна приготовить для внутривенного

Введение медицинская сестра?

- A* 0,4% раствор индигокармина
- B* 0,5% раствор хлоргексидина биглюконата
- C* Раствор ртути окисианида
- D* Верографин
- E* Уротраст

8

К Вам обратился больной 38 лет с жалобами на затрудненное мочеиспускание. Струя мочи стала узкой и тонкой. При мочеиспускании препуциальный мешок растягивается. Из анамнеза: больной в прошлом болел гонореей. Что с больным?

- A* Цистит
- B* Постгонорейный уретрит

*С* Фимоз после перенесенной гонореи  
*Д* Аденома простаты  
*Е* Нефрит

**9**

В больного внезапная острая боль в поясничном участке с правой стороны, иррадиирующая в яичко, в головку полового члена, внутреннюю поверхность бедра. Для какой патологии характерны эти признаки?

*А* Острый холецистит  
*В* Острый аппендицит  
*С* Печеночная колика  
*Д* Острый панкреатит  
*Е* Почечная колика

**10**

Ваши действия при приступе почечной колики в больного?

*А* Кровоостанавливающие средства  
*В* Спазмолитики, обезболивающие, тепло  
*С* Антибиотики, сульфаниламиды  
*Д* Антигистаминные препараты  
*Е* Катетеризация мочевого пузыря

**11**

Больному 60 лет течение наложена цистостома - дренирование мочевого пузыря с целью оттока мочи. На 4 день во время перевязки больного, медсестра обратила внимание на покраснение и раздражение кожи вокруг резинового дренажа. Что она должна сделать для устранения этих симптомов?

*А* Удалить дренаж  
*В* Доложить врачу  
*С* Сообщить больному  
*Д* Обмыть водой  
*Е* Нанести пасту Лассара

**12**

Старшая медсестра хирургического отделения составляет порционное требование питания больных. Какой диетический стол назначают урологическим больным в предоперационном периоде?

*А* Стол № 9  
*В* Стол № 5  
*С* Стол № 1  
*Д* Стол № 7

*Е* Стол № 15

**13**

Вы – медицинская сестра урологического отделения готовите больного к экскреторной урографии. Каким препаратом нельзя воспользоваться для внутривенного введения?

*А* Сергозин  
*В* Уротраст  
*С* Раствор бария  
*Д* Диодон  
*Е* Индигокармин

**14**

Вы работаете в урологическом отделении, куда только что поступил больной с аденомой предстательной железы, который жалуется на боль внизу живота, невозможность мочеиспускания. Назовите независимые вмешательства медсестры при оказании неотложной помощи.

*А* Дать обезболивающие  
*В* Дать мочегонные  
*С* Положить пузырь со льдом на живот  
*Д* Дать спазмолитики  
*Е* Положить грелку на живот, вызвать рефлекторное мочеиспускание

**15**

Пациент К., 73 л., который страдает аденомой предстательной железы жалуется на боль в надлобковой области, отсутствие мочеотделения в течение 18 часов. Какие имеются проблемы в пациента?

*А* Анурия  
*В* Хроническая задержка мочи  
*С* Острая задержка мочи  
*Д* Олигоурия  
*Е* Полиурия

**16**

Вы – медицинская сестра медпункта метрополитена. К Вам обратился сотрудник станции с жалобами на схваткообразную боль в поясничной области, частое мочеиспускание, иррадиацию боли в промежность,

однократную рвоту. При осмотре: положительный симптом Пастернацкого. Какой из перечисленных препаратов целесообразнее всего использовать при оказании доврачебной помощи?

- A* Баралгин, но-шпа
- B* Фитолизин, анальгин
- C* Цистенал, димедрол
- D* Трамадол, галоперидол
- E* Лазикс эуфиллин

17

В больного внезапно возникла боль в области поясницы, которая иррадирует вниз живота и половые органы, усиливается при движениях, мочеиспускание затруднено, болезненно. Это характерно для:

- A* Перфоративной язвы желудка
- B* Аппендицита
- C* Острого холецистита
- D* Острого панкреатита
- E* Почечной колики

18

Больной 63-х течение, жалуется на боль в области мочевого пузыря распирающего характера, невозможность самостоятельного мочеиспускания. Из анамнеза известно, что в течение последних нескольких лет болеет мочекаменной болезнью. Объективно: в области мочевого пузыря отмечается напряжение, болезненность при пальпации. Мочевой пузырь увеличен в размерах в результате переполнения мочой. Какое осложнение Вы заподозрите?

- A* Острый пиелонефрит
- B* Цистит
- C* Острая задержка мочи
- D* Почечная колика
- E* Аппендикулярный инфильтрат

19

Как называется метод обследования мочевого пузыря с помощью прибора в виде металлического катетера, который имеет электрическую лампочку и оптическую систему?

- A* Цистография
- B* Цистоскопия

- C* Пиелография
- D* Телескопия
- E* Уретроскопия

20

Мужчина 36 л., жалуется на резкую боль в нижних отделах живота, невозможность мочеиспускания. Спеша в туалет, перебежал дорогу и был сбит автомобилем. Что можно заподозрить в пострадавшего?

- A* Разрыв подвздошной кишки
- B* Разрыв мочеоточника
- C* Травму почки
- D* Разрыв мочевого пузыря
- E* Разрыв сосудов брыжейки

21

Пациент К. 65 течение находится на лечении в урологическом отделении. Самостоятельно двигается, обслуживает себя, но не может самостоятельно мочиться. Мочеиспускание через постоянный катетер. Какую физиологичную проблему может обнатужить медсестра в пациента?

- A* Неадекватная двигательная активность
- B* Невозможность самостоятельно одеваться
- C* Риск развития инфекции мочевых путей
- D* Риск образования пролежней кожи
- E* Страх перед недержанием мочи

22

При повреждении почек важным признаком является:

- A* Гематурия.
- B* Пиурия.
- C* Полиурия.
- D* Цилиндрурия.
- E* Дизурия.

23

Определите методы диагностирования камней мочевого пузыря:

- A* Хромоцистоскопия
- B* Цистоскопия, цистография, обзорная рентгенография.
- C* На основе данных анамнеза
- D* На основе клинического обследования
- E* Ретроградная пиелография

**24**

Каким катетером медицинская сестра проводит катетеризацию мочевого пузыря у мужчин в случае острой задержания мочи:

- A** Катетером Петцера
- B** Металлическим
- C** Пластмассовым
- D** Резиновым
- E** Катетером Неландера

**25**

В больного внезапная острая боль в поясничной области с правой стороны, иррадиирующая в яичко, в головку полового члена, внутреннюю поверхность бедра. Для какой патологии характерны эти признаки?

- A** Кишечная непроходимость
- B** Острый аппендицит
- C** Печеночная колика
- D** Острый панкреатит
- E** Почечная колика

**26**

Доврачебная помощь при почечной колике:

- A** Горячие ножные ванны
- B** Мочегонные средства
- C** Грелка на поясничную область
- D** Пузырь с льдом на поясничный участок
- E** Введение зифиллина

**27**

Мужчина, 35 лет, жалуется на острую боль в пояснице с иррадиацией в мошонку, промежность, которая появилась после длительной езды в машине. Со стороны внутренних органов изменений нет. Живот безболезненный, симптом Пастернацкого положительный. В анализе мочи большое количество кристаллов мочевой кислоты, лейкоцитов эритроцитов. Какой наиболее вероятный

диагноз?

- A** Почечная колика
- B** Острый цистит
- C** Острый пиелонефрит
- D** Аденома предстательной железы
- E** Пахово-мошоночная грыжа

**28**

Доврачебная неотложная помощь при приступе почечной колики:

- A** приложить пузырь с льдом
- B** ввести уросептики, антибиотики
- C** ввести мочегонные препараты
- D** приложить грелку или сделать теплую ванну
- E** ввести сердечные препараты

**29**

Доврачебная помощь при почечной колике:

- A** пузырь с льдом на поясничную область
- B** теплая грелка или горячая ванна
- C** спазмолитические препараты
- D** наркотические анальгетики
- E** индифферентная ванна

**30**

Больной Н., 27 лет, поступил в больницу после травмы живота. Жалобы на боль в животе, прекращение выделения мочи, вздутие живота. При пальпации живота отмечается напряжение мышц, положительный симптом Щоткина-Блюмберга. В брюшной полости есть жидкость, которая перемещается при изменении положения больного. С чем связана проблема пациента?

- A** Острый цистит
- B** Внебрюшинное повреждение мочевого пузыря
- C** Острый аппендицит
- D** Острый пиелит
- E** Внутривнутрибрюшное повреждение мочевого пузыря

## Вариант 2

1

Пациент К. 65 лет находится на лечении в урологическом отделении.

Самостоятельно

двигается, обслуживает себя, но не может самостоятельно мочиться.

Мочеиспускание через постоянный катетер. Какую физиологичную проблему может обнаружить медсестра у пациента?

*A* Неадекватная двигательная активность

*B* Невозможность самостоятельно одеваться

*C* Риск развития инфекции мочевых путей

*D* Риск образования пролежней кожи

*E* Страх перед недержанием мочи

2

При повреждении почек важным признаком является:

*A* Гематурия.

*B* Пиурия.

*C* Полиурия.

*D* Цилиндрурия.

*E* Дизурия.

3

Определите методы диагностирования камней мочевого пузыря:

*A* Хромоцистоскопия

*B* Цистоскопия, цистография, обзорная рентгенография.

*C* На основе данных анамнеза

*D* На основе клинического обследования

*E* Ретроградная пиелография

4

Каким катетером медицинская сестра проводит катетеризацию мочевого пузыря у мужчин в случае острой задержки мочи:

*A* Катетером Петцера

*B* Металлическим

*C* Пластмассовым

*D* Резиновым

*E* Катетером Неландера

5

У больного внезапная острая боль в

поясничной области с правой стороны, иррадиирующая в яичко, в головку полового члена, внутреннюю поверхность бедра. Для какой патологии характерны эти признаки?

*A* Кишечная непроходимость

*B* Острый аппендицит

*C* Печеночная колика

*D* Острый панкреатит

*E* Почечная колика

6

Доврачебная помощь при почечной колике:

*A* Горячие ножные ванны

*B* Мочегонные средства

*C* Грелка на поясничную область

*D* Пузырь с льдом на поясничную область

*E* Введение эуфиллина

7

Мужчина, 35 лет, жалуется на острую боль в пояснице с иррадиацией в мошонку, промежность, которая появилась после длительной езды в машине. Со стороны внутренних органов изменений нет. Живот безболезненный, симптом Пастернацкого положительный. В анализе мочи большое количество кристаллов мочевой кислоты, лейкоцитов, эритроцитов. Какой наиболее вероятный диагноз?

*A* Почечная колика

*B* Острый цистит

*C* Острый пиелонефрит

*D* Аденома предстательной железы

*E* Пахово-мошоночная грыжа

8

Доврачебная неотложная помощь при приступе почечной колики:

*A* приложить пузырь с льдом

*B* ввести уросептики, антибиотики

*C* ввести мочегонные препараты

*D* приложить грелку или сделать теплую ванну

*E* ввести сердечные препараты

9

Доврачебная помощь при почечной колике:

*А* пузырь с льдом на поясничную область

*В* теплая грелка или горячая ванна

*С* спазмолитические препараты

*Д* наркотические анальгетики

*Е* индифферентная ванна

10

Больной Н., 27 лет, поступил в больницу после травмы живота. Жалобы на боль в животе, прекращение выделения мочи, вздутия живота. При пальпации живота отмечается напряжение мышц, позитивный симптом Щоткина-Блюмберга. В брюшной полости есть жидкость, которая перемещается при изменении положения больного. С чем связанная проблема пациента?

*А* Острый цистит

*В* Внебрюшинное повреждение мочевого пузыря

*С* Острый аппендицит

*Д* Острый пиелит

*Е* Внутривентральное повреждение мочевого пузыря

11

Больному 60 лет наложена цистостома - дренирование мочевого пузыря с целью оттока мочи. На 4 день во время перевязки больного, медсестра обнаружила покраснение и раздражение кожи вокруг резинового дренажа. Что она должна сделать для устранения этих симптомов?

*А* Удалить дренаж

*В* Доложить врачу

*С* Сообщить больному

*Д* Обмыть водой

*Е* Нанести пасту Лассара

12

Старшая медсестра хирургического отделения составляет порционное требование питания больных. Какой диетический стол назначают урологическим больным в предоперационном периоде?

*А* Стол № 9

*В* Стол № 5

*С* Стол № 1

*Д* Стол № 7

*Е* Стол № 15

13

Вы – медицинская сестра урологического отделения готовите больного к экскреторной урографии. Каким препаратом нельзя воспользоваться для внутривенного введения?

*А* Сергозин

*В* Уротраст

*С* Раствор бария

*Д* Диодон

*Е* Индигокармин

14

Вы работаете в урологическом отделении, куда только что поступил больной с аденомой предстательной железы, который жалуется на боль внизу живота, невозможность мочеиспускания. Назовите независимые вмешательства медсестры при оказании неотложной помощи.

*А* Дать обезболивающие

*В* Дать мочегонные

*С* Положить пузырь с льдом на живот

*Д* Дать спазмолитики

*Е* Положить грелку на живот, вызывать рефлекторное мочеиспускание

15

Пациент К., 73 л., который страдает аденомой предстательной железы, жалуется на боль в надлобковой области, отсутствие мочеотделения в течение 18 часов. Какие имеются проблемы пациента?

*А* Анурия

*В* Хроническая задержка мочи

*С* Острая задержка мочи

*Д* Олигоурия

*Е* Полиурия

16

Вы – медицинская сестра медпункта метрополитена. К Вам обратился сотрудник станции с жалобами на схваткообразную боль в поясничной

области, частое мочеиспускание  
иррадиацию боли в промежность,  
однократную рвоту. При осмотре:  
позитивный симптом

Пастернацкого. Какой из перечисленных  
препаратов целесообразнее всего  
использовать при оказании доврачебной  
помощи?

- A** Баралгин, но-шпа
- B** Фитолизин, анальгин
- C** Цистенал, димедрол
- D** Трамадол, галоперидол
- E** Лазикс, зуфиллин

**17**

У больного внезапно возникла боль в  
области поясницы, которая иррадирует  
вниз живота и половые органы,  
усиливается при движениях,  
мочеиспускание затруднено, болезненно.  
Это характерно для:

- A** Перфоративной язвы желудка
- B** Аппендицита
- C** Острого холецистита
- D** Острого панкреатита
- E** Почечной колики

**18**

Больной 63-х лет, жалуется на боль в  
области мочевого пузыря распирающего  
характера, невозможность  
самостоятельного мочеиспускания. Из  
анамнеза известно, что в течение  
последних нескольких лет болеет  
мочекаменной болезнью. Объективно: в  
области мочевого пузыря отмечается  
напряжение, болезненность при  
пальпации. Мочевой пузырь увеличен в  
размерах в результате переполнения  
мочой. Какое осложнение Вы  
заподозрите?

- A** Острый пиелонефрит
- B** Цистит
- C** Острая задержка мочи
- D** Почечная колика
- E** Аппендикулярный инфильтрат

**19**

Как называется метод обследования  
мочевого пузыря с помощью прибора в  
виде металлического катетера, который  
имеет электрическую лампочку и

оптическую систему?

- A** Цистография
- B** Цистоскопия
- C** Пиелография
- D** Телескопия
- E** Уретроскопия

**20**

Мужчина 36 л., жалуется на резкую боль  
в нижних отделах живота, невозможность  
мочеиспускания. Спеша в туалет,  
перебегал дорогу и был сбит  
автомобилем. Что можно заподозрить у  
пострадавшего?

- A** Разрыв подвздошной кишки
- B** Разрыв мочеточника
- C** Травму почки
- D** Разрыв мочевого пузыря
- E** Разрыв сосудов брыжейки

**21**

Неотложная помощь при почечной  
колике.

- A** Введение баралгина
- B** Холод на поясницу
- C** Назначение диуретиков
- D** Введение натрия хлорида
- E** Введение глюкозидов

**22**

У больного во время мочеиспускания  
выделяется кровь. Как называется эта  
патология?

- A** Тромбоцитурия
- B** Пиурия
- C** Гематурия
- D** Химурия
- E** Эритроцитурия

**23**

Каким катетером медицинская сестра  
проводит катетеризацию мочевого  
пузыря у мужчин в случае острой  
задержки мочи?

- A** Катетером Петцера
- B** Металлическим
- C** Не суть важно
- D** Резиновым
- E** Катетером для мочеточника

**24**

С помощью манипуляционного

цистоскопа через отверстия мочеточников проводят катетеризацию одного или двух мочеточников тонкими катетерами, через них вводят водорастворимые контрастные препараты (уротраст), которые наполняют мочеточники и почечные лоханки. После этого проводят обзорный рентгеновский снимок, на котором изображены почечные лоханки и мочеточники. Этот метод носит название:

- A Экскреторная урография*
- B Ретроградная пиелография*
- C Хромоцистоскопия*
- D Цистоскопия*
- E Внутривенная урография*

**25**

Какое название имеет аппарат для измельчения камней в почках и мочевом пузыре?

- A Литотриптор*
- B Катетеризационный цистоскоп*
- C Катетер*
- D Зажим Федорова*
- E Катетер для мочеточника*

**26**

На прием обратилась женщина с жалобами на схваткообразные боли в пояснице слева, которые отдают в половые органы, частое мочеиспускание. При осмотре: пациентка беспокойна, часто меняет положение в результате нестерпимой боли. Какой симптом наиболее информативен для уточнения диагноза?

- A Симптом Ровзинга*
- B Симптом Щоткина-Блюмберга*
- C Симптом Пастернацкого*
- D Симптом Ситковского*
- E Симптом Воскресенского*

**27**

Пациент 50-ти лет находится на обследовании в урологическом отделении. Пациенту

назначенная хромоцистоскопия. Какой раствор должна приготовить для внутривенного введения медицинская сестра?

- A 0,4\% раствор индигокармина*
- B 0,5\% раствор хлоргексидина биглюконата*
- C Раствор ртути оксицианида*
- D Верографин*
- E Уротраст*

**28**

К Вам обратился больной 38 лет с жалобами на затрудненное мочеиспускание. Струя мочи стала узкой и тонкой. При мочеиспускании препуциальный мешок растягивается. Из анамнеза: больной в прошлом болел гонореей. Что с больным?

- A Цистит*
- B Постгонорейный уретрит*
- C Фимоз после перенесенной гонореи*
- D Аденома простаты*
- E Нефрит*

**29**

У больного внезапная острая боль в поясничной области с правой стороны, иррадиирующая в яичко, в головку полового члена, внутреннюю поверхность бедра. Для какой патологии характерны эти признаки?

- A Острый холецистит*
- B Острый аппендицит*
- C Печеночная колика*
- D Острый панкреатит*
- E Почечная колика*

**30**

Ваши действия при приступе почечной колики у больного?

- A Кровоостанавливающие средства*
- B Спазмолитики, обезболивающие, тепло*
- C Антибиотики, сульфаниламиды*
- D Антигистаминные препараты*
- E Катетеризация мочевого пузыря*